

**OBSERVATOIRE DES MÉDICAMENTS, DES DISPOSITIFS MÉDICAUX ET DES INNOVATION
THÉRAPEUTIQUES – RÉGION CENTRE
- OMÉDIT -**

COMMISSION DOULEUR	Fiche Bon Usage	<i>Date de rédaction Mars 2001</i>
	Equianalgésie des opioïdes par rapport à la morphine orale	<i>Date de réactualisation : Septembre 2013</i>

PRODUIT	COEFFICIENT	ESTIMATION DE LA DOSE DE MORPHINE ORALE
Palier II		
Codéine orale	1/6	60 mg de codéine ≈ 10 mg de morphine
Tramadol oral	1/5	50 mg de tramadol ≈ 10 mg de morphine
Dihydrocodéine orale	1/3	60 mg de DHC ≈ 20 mg de morphine
Palier III		
Buprénorphine orale	7,5	4 mg de buprénorphine ≈ 30 mg de morphine
Nalbuphine inj	2	10 mg de nalbuphine ≈ 20 mg de morphine
Fentanyl transcutané	100	25 µg/h ≈ 60 mg de morphine
Hydromorphone orale	8	4 mg d'hydromorphone ≈ 32 mg de morphine
Morphine orale	1	Opioïde étalon
Oxycodone orale	2	10 mg d'oxycodone ≈ 20 mg de morphine