

Delysid (LSD 25)

Tartrate de diéthylamide de l'acide lysergique

Dragées à 25 µg.

Ampoules à 1 cc = 100 µg par voie orale.

Les solutions en ampoules peuvent aussi être administrées par voie S.C. ou I.V. L'effet est le même que par voie orale, avec un temps de latence légèrement diminué.

Propriétés

À très petites doses (0,5 à 2 µg par kilo de poids), le Delysid trouble passagèrement les affects, produisant des hallucinations, des phénomènes de dépersonnalisation, une prise de conscience d'événements refoulés et des symptômes neuro-végétatifs légers. L'effet commence 30 à 90 minutes après la prise. Cet état dure généralement 5 à 12 heures, mais on peut observer la persistance de certains effets comme le trouble des affects pendant quelques jours.

Mode d'emploi

Pour la prise par voie orale, diluer le contenu de l'ampoule de Delysid dans de l'eau distillée à 1 % d'acide tartrique ou dans de l'eau plate sans chlore.

La solution en ampoule provoque une résorption sensiblement plus rapide et plus sûre que les dragées.

Les ampoules non ouvertes, tenues à l'abri de la lumière et au frais n'ont pas de date limite d'utilisation. Des ampoules cassées ou des solutions déjà diluées gardent leurs propriétés 1 à 2 jours si elles sont conservées dans des réfrigérateurs.

Indications, posologie

a) Pour la détente psychique en thérapie psychanalytique, en particulier dans les névroses d'angoisse ou obsessionnelles:

Dose initiale: 25 µg (1/4 ampoule ou 1 dragée); suivant les besoins, augmenter la dose de 25 µg à chaque fois jusqu'à obtention de la dose active, qui se situe en moyenne, selon les patients, entre 50 et 200 µg. Les traitements au Delysid sont à renouveler toutes les semaines environ.

b) Recherches expérimentales sur la nature des psychoses: le Delysid permet au médecin qui se livre à une auto-expérimentation d'entrevoir le monde des idées de la maladie mentale et donc d'étudier la pathogenèse par des psychoses-types, de courte durée chez le sujet d'expérience normal.

Pour des gens au psychisme sain, généralement une dose de 25 à 75 µg suffit (en moyenne, 1 µg par kilo de poids). Certains psychotiques ou alcooliques chroniques ne réagissent qu'à des doses supérieures (2 à 4 µg par kilo de poids).

Précautions d'emploi

Des états psychiques anormaux peuvent être aggravés par le Delysid. Il ne faut donc utiliser ce médicament qu'avec une vigilance particulière chez des sujets prédisposés à la psychose ou à tendance suicidaire. La labilité psychique induite par le Delysid et la tendance aux actes impulsifs peuvent perdurer quelques jours dans des cas exceptionnels.

C'est pourquoi, à chaque fois que l'on administrera du Delysid, on observera une surveillance médicale stricte et sans relâche, pendant toute la durée du traitement.

Antidote

En injectant 50 mg de chlorpromazine en I.M., on écartera rapidement les états d'ivresse induits par le Delysid.

Littérature à disposition sur demande.

SANDOZ A. G. BASEL (Suisse)